Alla ricerca..... del miglior
verde urbano:il contributo
dell'Allergologo

Floriano Bonifazi

Il Panda(il bello),Il Verde(il buono ?),
l'Allergologo(Il Caro Estinto)

Gli allergeni non sono tutti uguali

298 Platts-Mills

TABLE I. Comparison of mammalian, arthropod, and other allergens

	Mammals*	Arthropods	Pollens/ fungi
Evolutionary distance	~75	600	>1000
Major allergens	Fel d 1 Can f 1 Mus m 1	Der p 1† Bla g 2 Der p 2	Lol p 1 Bet v 1
DNA	Methylated	Unmethylated	Mixed
Daily exposure	~1.0 µg	2-10 ng	2-10 ng
Immune response			
IgE prevalence	5% to 15%	As high as 35%	As high as 30%
IgE antibody titer	Generally low	As high as 300 IU/mL‡	Can be very high‡
Tolerance§	Common	Unusual	Unusual

*Evolutionary distance is length of time (in millions of years) since there was a common ancestor with human beings. Birds and reptiles separated from mammals 310 million years ago. Dates derived from Dawkins.³³

†Der p 1 is a cystein protease; Bla g 2 is homologous to an enzyme but may not be active.

‡IgE response high enough to contribute to total IgE.

§Tolerance as judged by an IgG and IgG₄ antibody response without IgE antibody, and with no effect on total serum IgE.

FIG 1. The relevance of evolutionary distance to immunogenicity and cross-reactivity. Evolutionary distance is given as the length of time to a common ancestor with human beings. Major inhalant allergens are shown with an asterisk. Cross-reactive allergens include (1) scabies with dust mites, (2) cockroaches with ladybugs, and (3) dogs and cats. The mammalian allergens that induce tolerance are shown in red.

Fossile della prima
pianta con fiori e
polline, battezzata

*Archaeofructus
liaoningensis.*

Risale a 140 milioni di
anni fa, a cavallo fra il
Giurassico e il Cretaceo

Archaeofructus liaoningensis

ACERACEAE

...Gesù passa in mezzo alla folla di Gerico. Il capo della comunità di Gerico, Zaccheo, si arrampica su un sicomoro per vederLo, perché era piccolo di statura.

A.
pseudoplatanus

Luca 19,1-10

ACERACEAE

A. negundo

Pianta utilizzata per alberature e giardini, sono consigliate solo le piante femminili che non liberano polline

Allergenicità: minima Fioritura: aprile-maggio

Relazione tra sensibilizzazione allergica ed esposizione

Charles Blackley

1873

Controversy existed as to the cause of the symptoms; some experts attributed the symptoms to emanations from the hay, while others felt that this was coincidence and the true cause was related to a combination of heat, sunshine, humidity and exercise (3). In 1873, Charles Blackley (1) published his classic monograph, documenting pollen – grass pollen in particular – as the cause of these seasonal symptoms. Blackley does refer to some published cases of nasal symptoms induced by the application of whole pollen grains; however, Blackley's treatise is widely regarded as the first substantial publication using allergen challenge.

Ogni anno in Europa viene cementificata un'area grande come Roma. In 50 anni come l'Ungheria.

La produzione di cemento contribuisce a quasi 1/10 delle emissioni globali di CO₂

Se l'industria del cemento fosse un Paese sarebbe il terzo piu' grande emittente di CO₂ del mondo dopo Cina e USA

<https://www.bbc.com/news/science-environment>
2020

Riduzione del numero di piante nell'ecosistema città a causa dell'eccessiva cementificazione.

The Rockefeller Foundation–Lancet Commission on planetary health

Planetary health – planetary boundaries

la politica è in grado di coordinare tutto questo
L'Allergologo puo' contribuire?

Legge 10/2013

Norme per lo sviluppo delle aree verdi urbane

G.Uff.N°27-1 febbraio 2013

Pag 24

Norme da prevedere in caso di impiego di specie particolari

-tossiche/velenose

-Con pollini allergenici

Green Space and mortality: a systematic review and meta-analysis of cohort studies

Rojas Rueda et al: Lancet planetary health 2019

Conclusions

- 1) Evidence of reduction in mortality in areas with more green spaces
- 2) Interventions to increase and manage green spaces should therefore be considered strategic for public health

GREEN AND LIVEABLE

- Greening cities has many health benefits including longer life expectancy, fewer

mental health problems, better cognitive function, better mood and healthier babies

- It mitigates air pollution, heat and noise levels.

- CO2 sequestration

- Replacing roads and parking with green environments can be one way forward to change an environment from detrimental to beneficial.

Attribution & Detection studies - Health

©

Heat-related mortality fraction:
0.98% in counterfactual // 1.56% in
factual

→ 0.58% of all cause mortality attributed
to heat induced by anthropogenic climate
change

Code and sample of data available in:
https://github.com/anavica/mcc_ccattr_NCC

I pollini allergenici

- Circa 250.000 specie vegetali sono produttrici di polline
-
- In Europa sono state importate negli ultimi 500aa circa 12000 specie vegetali
 - I pollini allergenici sono prodotti solo da un centinaio di piante

Caratteristiche ideali delle piante destinate al verde urbano

- Robustezza del tronco
- Chioma compatta
- Modesta manutenzione
- Adattabilità
- Resistenza ai patogeni
- Assenza di nocività

E il tipo di impollinazione??

➤ Anemofila

➤ Entomofila

Campionatore
pollinico e
sporologico

INQUINAMENTO 2

Olivo

Executive
Agency for
Health and
Consumers

HIALINE

Health Impacts of Airborne Allergen
Information Network

HIALINE Experimental Set-Up

Munich ZAUM 1.80 m over ground, 520
m above sea level

Burkard Pollen trap
(pollen in ambient air)

10 l/min

“Chemvol®” Sampler
(allergens in ambient air)

800 l/min

Ole e 1

Phl p 5

Bet v 1

Olive Pollen and Ole e 1 in Ambient Air

Spain 2009

Carmen Galan, University of Cordoba, Spain

Gli scienziati di CAMS usano una modellazione numerica per calcolare le concentrazioni di polline di cinque delle specie più comuni, betulla, olivo, erba, ambrosia e ontano, in un momento specifico e fornire previsioni fino a quattro giorni in anticipo. Queste informazioni anticipate sulle concentrazioni di polline danno ai 100 milioni di allergici in Europa l'opportunità di iniziare le cure in anticipo o di limitare le attività all'aperto quando la quantità dei pollini è particolarmente alta.

Birch pollen: forecast for 12 April 2021, 18h CET

Multisectoral approach

Multi sectorial and systemic approaches are needed to address current problems and find solutions

Piante risultate poi molto allergizzanti
suggerite da architetti e urbanisti da inizio(?)
900' e fino alla fine(?)...

Piante arboree maggiori:

- Cipresso
- Betulla, Ontano
- Nocciolo, Carpino
- Olivo
- Castagno, Quercia e Faggio

Regola dello spazio verde 3-30-300

- Recentemente Cecil Konijnendijk, un esperto in selvicoltura urbana
- Ha proposto la regolamentazione del «pollice verde in città»

Ogni cittadino dovrebbe

- Vedere da casa almeno tre alberi
- avere il 30% di copertura arborea nel proprio quartiere
- non vivere più di 300 metri lontano dai parchi o spazi verdi

n
/ F
r
e
b
u
r
g

Parietaria judaica

Riduzione del particolato e dell'inquinamento acustico

Cladosporium cladosporoides

Cladosporium herbarum

Cladosporium sphaerospermum

Ganoderma applanatum

Chaetomium globosum

Stachybotrys chartarum

Stachybotrys (Memnoniella) echinata

Alternaria alternata

Aspergillus sp.

Penicillium sp.

Coprinus sp.

Dicyna olivacea

Ascotricha chartarum

Gliomastix murorum

Pithomyces chartarum

Ulocladium chartarum

I cambiamenti climatici si ripercuotono sugli aeroallergeni

- Distribuzione delle piante e dispersione dei pollini(certo)
- Periodo di pollinazione(certo)
- Produzione di aeroallergeni pollinici (probabile)
- Contenuto allergenico dei pollini(probabile)

Global Pollen Counts

REKJAVIK, ICELAND

Effetti positivi del verde sulla salute

- 1) Riduzione degli effetti delle isole di calore
- 2) Ridotta mortalità cardiovascolare
- 3) Ridotta prevalenza del diabete di tipo 2
- 4) Migliorato funzionamento del sistema immunitario
- 5) Aumentato peso alla nascita

Effetti Negativi

- 1) Aumentato rischio di sviluppare allergie ed asma o sua severità
- 2) Eccesso di precursori dell'ozono nell'aria
- 3) Possibile aumentata esposizione a pesticidi o erbicidi
- 4) Aumentata esposizione a vari tipi di insetti
- 5) Eccessiva esposizione a raggi UV

Effetti Dubbi sui rapporti tra verde ed aumento atti criminosi

Percentage of people reporting a chronic respiratory disease by degree of urbanisation in the EU28 (2014)

Source: Eurostat, European Health Interview Survey (EHIS) [hlth_ehis_cd1u]

Lombardi C., Cottini :
“La Thunderstrom
Asma” in: *Aerobiologia*
ed Allergeni stagionali.
Ed. Ariano R., Bonifazi
F. (E.C.I.G. 2007)

Figure 1. Parietaria pollen bursting under osmotic shock with release of cytoplasmic fragments carrying allergens.

Granuli di amido di
diametro < 5 millimicron
detti AMILOPLASTI
possono essere liberati in
atmosfera da parte di
pollini di
GRAMINACEAE,
durante temporali o in
caso di elevata umidità
relativa, veicolando
allergeni pollinici.
La loro presenza è
correlata con epidemie
asmatiche.

1 Large pollen grain

2 (zoom out)

3 Expel sub-pollen particles

4 Abundant sub-pollen particles

(Bacsi et al., 2006)

Melbourne: November 21, 2016

- Grass pollen concentrations on Nov 21, 2016, were extremely high (>100 grains/m³)
- Thunderstorms occurred
- Within 30 hours, there were 3365 (672%) excess respiratory-related presentations to emergency departments
- 476 (992%) excess asthma-related admissions to hospital

Rising CO₂, of and by itself, will alter life as we know it.....

Here is what happens with more CO₂

385 ppm 535 ppm 685 ppm 835 ppm

rients

Carbon Dioxide

Piante risultate poi molto allergizzanti
suggerite da architetti e urbanisti da inizio(?)
900' e fino alla fine(?)...

Piante arboree maggiori:

- Cipresso
- Betulla, Ontano
- Nocciolo, Carpino
- Olivo
- Castagno, Quercia e Faggio

Cupressacee Taxacee

Prevalenza
Della Pollinosi da
Cupressacee
In Italia= 18,4 %

Monadi
Apolari
Circolari
Monoporato
Esina: granulata e sottile
Intina spessa con forma a stella.
I granuli hanno la tendenza a rompersi
D: 22 mmicron

Juniperus communis

Ambrosia trifida

Monade.
Isopolare.
Sferoidale o Circolare.
Tricolporato.
Pori ellittici, ricoperti di membrana liscia.
Solchi brevi e stretti.
Esina con microechinature smusse a
Base più larga rispetto all'Artemisia.
D: 20 mmicron.

**NORD: 29 %
CENTRO: 10-5 %
SUD: 2 %**

Percentage of population sensitised to Ambrosia pollen

Climate Change and Future Pollen Allergy in Europe

- Based on not standardized studies
- Assumption of a dose- dependent risk of sensitization

Examples of research projects – ATOPICA

Ragweed=
Ambrosia
artemisiifolia

www.atopica.eu

See video on
YouTube!

Atopic Diseases in Changing Climate, Land Use and Air Quality (2011-2014)
€3.5 million from the EU

Play online and
learn how to
distinguish
ambrosia
play»

Print, play and
discover who
the evil
alien is
download»

Play with Dr Atopica on
the project website!

Percentage of population sensitized to ragweed pollen

Riduzione dei VOC da parte di piante indoor

- La NASA ha testato varie piante in grado di rimuovere concentrazioni di VOC tossici come:
formaldeide, ammoniaca, xilene, toluene fino al 70% all'interno delle abitazioni
- *Envr Sci pollut 2014, Front Plant Sci 2017,8;1316*

Capacita' di filtrazione oraria del Ficus Benjamina

- 1)formaldeide microgrammi 20
 - 2)Benzene 7
 - 3)acetone 19
 - 4)Ammoniaca 5
-
- Rita Baraldi IBIMET CNR 2017

Hautarzt. 2001 Oct;52(10 Pt 2):935-7

[Anaphylactic reaction to *Ficus benjamina* (weeping fig)]

Werfel S , Ruëff F , Przybilla B .

Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie, Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München, Frauenlößstrasse 9-11, 80337 München.

Effetti positivi del verde sulla salute

- 1) Riduzione degli effetti delle isole di calore
- 2) Ridotta mortalità cardiovascolare
- 3) Ridotta prevalenza del diabete di tipo 2
- 4) Migliorato funzionamento del sistema immunitario
- 5) Aumentato peso alla nascita

Effetti Negativi

-
- 1) Aumentato rischio di sviluppare allergie ed asma o sua severità
 - 2) Eccesso di precursori dell'ozono nell'aria
 - 3) Possibile aumentata esposizione a pesticidi o erbicidi
 - 4) Aumentata esposizione a vari tipi di insetti
 - 5) Eccessiva esposizione a raggi UV

Effetti Dubbi sui rapporti tra verde ed aumento atti criminosi

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA

Emissioni di AVOCS e BVOCS e qualita' dell'aria

- AVOC-Processi produttivi industriali,traffico veicolare,miniere etc
- BVOC-Isoprene C_5H_8 ,Monoterpene $C_{10}H_{16}$,Sesquiterpeni $C_{15}H_{24}$
- I BVOCS sono di origine biogenica e la loro concentrazione è 10 volte quella degli AVOCS

Per quale motivo le piante emettono i BVOC dalle loro foglie, fiori e frutti?

- 1) In quanto immobili serve loro per interagire con l'ambiente utilizzando proprio i BVOC come schermo contro gli attacchi di insetti erbivori o patogeni
- 2) Promuovono la riproduzione attraendo insetti pollinatori
- 3) Protezione della pianta da stress termico (l'emissione di isoprene aumenta con l'incremento della temperatura)

Cosa sono i BVOC?

Gas estremamente reattivi (isoprene 1/2 ora di emivita) che vanno incontro a reazioni chimiche complesse in atmosfera

- 1) I BVOCs danno origine alla formazione di O₃ troposferico e smog fotochimico in presenza di NO_x
- 2) Danno origine alla formazione di aerosol organici secondari di origine biogenica (BSOA) influenzando le proprietà fisiche dell'aria es: Formazione di nebbia e nuvole agendo sui nuclei di condensazione
- 3) Influenzano i tempi di persistenza di altri gas ad effetto serra come il metano
- **Appare quindi essenziale identificare le specie arboree che minimizzino sia l'impatto allergizzante ma anche i livelli di ozono e la formazione di aerosol secondari**

Alberi ad alta emissione in aree urbane(isoprene che supera 10 microgrammi per grammo di foglia secca ,per ora ,in condizioni standard di temperatura circa 25-30 C

- Populus alba isoprene 25 -28 microgrammi
- Populus nigra 29-76
- Quercus robur 40-76
- Salix 37
- Robinia Pseudoacacia 10-13
- Hewitt and Street 1992,aggiornato 2004

La «fissa» della contaminazione tra specialisti

- Padre Costantino da Avellino, Frate Irpino, poi fatto Santo da San Martino di Genova, Citta' ove ha vissuto in somma castita' e prolungati digiuni, dopo avermi ascoltato per giorni, nel tentativo di convertirmi, nutrendosi solo di bacche, un po' esasperato, mi guardo' alfin con occhio severo e allo stesso tempo con grande compassione e proclamo' con voce alta ed alterata: **Ma insomma Floriano non hai ancora compreso che gli specialisti vedono la contaminazione come il rischio di Morte per Sepsi!!!**
- Così' parlo' il Santo ma io non fui convertito, anzi ho convertito Lui a creare insieme l'AAIITO!!!
- Poi venne il PIA (Progetto Inquinamento Ancona).... e fui condannato per sempre alle pene dell'inferno....

Progetto PIA (PROGETTO INQUINAMENTO ANCONA)

ARIANET

ARPAM
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la BioEconomia
Dipartimento di Scienze Bio Agroalimentari

Coordinatore Scientifico-Estensore Progetto PIA
Dr.Floriano Bonifazi

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA

DOCUMENTO METODOLOGICO

La proposta progettuale è articolata in 4 principali TEMATICHE di interesse strategico per il PIA:

1. **Tematica Sanitaria**
2. **Tematica Monitoraggio ambientale degli inquinanti di natura inorganica con particolare riguardo alle PM 2,5**
3. **Tematica del Ruolo del Verde Urbano come inquinante di natura biologica o come Fattore di mitigazione dei danni da inquinamento**
4. **Tematica di Strategia di Comunicazione**

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA

C TEMATICA DEL RUOLO DEL VERDE URBANO COME INQUINANTE DI NATURA BIOLOGICA O COME FATTORE DI MITIGAZIONE DEI DANNI DA INQUINAMENTO

si attua attraverso le seguenti attività:

- C.1 Raccolta dati aerobiologici sulla qualità e quantità settimanale di pollini e spore fungine presenti in atmosfera in Ancona**

- C.2 Censimento del verde cittadino delle caratteristiche delle piante per il loro ruolo allergizzante,assorbente o fonte emissiva di terpeni con successiva ipotesi di impiego di piante potenzialmente meno allergizzanti nelle zone pubbliche e che possano mitigare l'inquinamento**

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA

- C.3 modellazione urbana finalizzata alla valutazione dei principali flussi d'aria che caratterizzano il sistema urbano all'altezza dei soggetti ricevitori (2m) durante periodi caratteristici per i massimi di impollinazione**

- C.4 Analisi microclimatica dell'attuale tessuto urbano ai fini della definizione delle fragilità di tale tessuto sempre in vista dell'utilizzo di questi risultati per la rigenerazione e la messa a punto di strategie di adattamento**

- C.5 Interventi di rigenerazione urbana e impatto sulla popolazione e consulenza alla PA di Ancona sul Piano di Adattamento climatico**

- C.6 Consulenza all'ufficio verde di Ancona per il censimento del Verde**

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA

C TEMATICA DEL RUOLO DEL VERDE URBANO COME INQUINANTE DI NATURA BIOLOGICA O COME FATTORE DI MITIGAZIONE DEI DANNI DA INQUINAMENTO

si attua attraverso le seguenti attività:

- C.1 Raccolta dati aerobiologici sulla qualità e quantità settimanale di pollini e spore fungine presenti in atmosfera in Ancona**
- C.2 Censimento del verde cittadino delle caratteristiche delle piante per il loro ruolo allergizzante,assorbente o fonte emissiva di terpeni con successiva ipotesi di impiego di piante potenzialmente meno allergizzanti nelle zone pubbliche e che possano mitigare l'inquinamento**

Area 1_Id 1_Zona 2- 101_Piazza Stamira

Valore BVOC Itree

9.74 kg/anno

Species	Percent	Potere allergenico	Emissioni BVOC
Pittosporum species	22,22		
Phoenix canariensis	17,78		
Pinus pinea	13,33		
Nerium oleander	13,33		
Pinus halepensis	11,11		
Cycas revoluta	4,44		
Quercus ilex	4,44		
Ligustrum spp	4,44		
Lagerstroemia indica	2,22		
Chamaerops humilis	2,22		
Other Species	4,44		

Legenda potere allergenico

basso	
da basso a moderato	
moderato	
alto	
da alto a elevato	
elevato	

Legenda livello BVOC

<1	basso
<1 - 10	moderato
>10	alto

- Objects**
- Buildings
- Flow v**
- 1.00 m/s
 - 2.00 m/s
 - 3.00 m/s
 - 4.00 m/s
 - 5.00 m/s

BVOC espressi in $\mu\text{g VOC g Leaf Dry weight}^{-1} \text{ h}^{-1}$

O₃ 11.48 kg

PM₁₀ 8.16 kg

Barcelona Superblock San Antoni

Before

After

Valore BVOC Itree 26.45 kg/anno

Species	Percent	Potere allergenico	Emissioni BVOC
Tilia species	26,27		
Pinus pinea	10,59		
Celtis australis	8,47		
Aesculus hippocastanum	7,63		
Acer negundo	6,36		
Pinus sylvestris	5,93		
Chamaerops humilis	5,08		
Phoenix canariensis	5,08		
Ulmus species	4,66		
Sophora japonica	4,66		
Other Species	15,25		

Legenda potere allergenico	
basso	
da basso a moderato	
moderato	
alto	
da alto a elevato	
elevato	

Legenda livello BVOC	
<1	basso
<1 - 10>	moderato
>10	alto

O₃ 66.92 kg

PM₁₀ 17.58 kg

CTP1_(101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 210, 218, 219, 220, 227, 235, 250)

O₃ 262.37 kg

PM₁₀ 158 kg

Valore BVOC Itree 135.47 kg/anno

Figura 36. Localizzazione della CTP1

Area 1

- Tilia tomentosa
- Tilia species

- Tilia species
- Nerium oleander
- Laurus nobilis

- Nerium oleander
- Cercis siliquastrum
- Platanus occidentalis
- Chamaerops humilis
- Pittosporum species
- Laurus nobilis
- Cedrus deodara
- Phoenix canariensis
- Catalpa bignonioides
- Juniperus spp

- Tilia species
- Prunus species
- Ligustrum species

- Pittosporum species
- Phoenix canariensis
- Pinus pinea
- Nerium oleander
- Pinus halepensis
- Cycas revoluta
- Quercus ilex
- Ligustrum species
- Lagerstroemia indica
- Chamaerops humilis

- Cupressus sempervirens
- Laurus nobilis
- Quercus robur
- Ligustrum species
- Nerium oleander
- Quercus ilex
- Ginkgo biloba 'Autumn Gold'
- Catalpa bignonioides
- Acer negundo
- Phoenix canariensis

- Tilia species
- Pinus pinea
- Celtis australis
- Aesculus hippocastanum
- Acer negundo
- Pinus sylvestris
- Chamaerops humilis
- Phoenix canariensis
- Ulmus species
- Sophora japonica

- Cercis siliquastrum
- Koelreuteria paniculata
- Cedrus deodara
- Laurus nobilis

- Sophora japonica
- Fraxinus excelsior
- Robinia pseudoacacia
- Ulmus species

O₃ 604.97 kg

PM₁₀ 347.11 kg

BENEFIT ANNUALI

1494 alberi totali

Un'autovettura in un anno percorre in media 15000 Km ed emette circa 90 g/Km.
 $90 \text{ g/Km} \times 15000 \text{ Km} = 1.350.000 \text{ g di CO}_2 \rightarrow 1,3 \text{ Ton di CO}_2$

Le specie arboree presenti nelle zone trattengono CO₂ per circa 152 autovetture.

BENEFIT ANNUALI 7056 alberi totali

- Pinus halepensis
- Cupressus sempervirens
- Platanus occidentalis
- Robinia pseudoacacia
- Fraxinus excelsior
- Pinus pinea
- Quercus ilex
- Populus x canadensis
- Tilia species
- Acer campestre

PINACEAE

Pinus spp.

Allergenicità: minima
Fioritura: aprile-maggio

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA

ANCONA respira

ALBERI CON BASSA ALLERGENICITA'

Tiglio (*Tilia cordata*)

**Platanus
(*Occidentalis*)**

Leguminosae

Ideale per alberature
cittadine e giardini
per la resistenza e la
splendida fioritura

Cercis siliquastrum
(albero di Giuda)

Allergenicità: minima
Fioritura: Marzo-aprile

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA

ALBERI CON BASSA ALLERGENICITA'

Garrya (Garriaceae)

Gelso (Moraceae)

Syring vulgaris (Rosaceae)

Sorbo (Rosaceae)

Allergenicità: minima (da vicinato)

Fioritura: giugno-agosto

Tiliaceae

Tilia cordata

Ideale per viali e alberature stradali,
fiorisce inizio estate, libera
pochissimi pollini in quanto utilizza
un'impollinazione entomogena

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA

Tiglio
nostrano
Famiglia:
Tiliacee

Piante di
10 anni al
momento
dell'
impianto

Assorbimento di
CO₂

Alta (2,8t/20a) capacità di accumulare CO₂ atmosferica nella biomassa (103Kg/a per i primi 5 anni, 155Kg/a per i successivi 15 anni)

Formazione
potenziale di O₃

Bassa emissione di VOC e un basso potenziale di formazione di Ozono (< 1g O₃/p/g)

Assorbimento potenziale
di inquinanti gassosi

Alta capacità potenziale di assorbire gli inquinanti gassosi

Potenziale di cattura
delle polveri

Alto potenziale di cattura delle polveri sottili

Ottima
capacità di
mitigazione
ambientale

potenzialita'
allergizzante
Nulla

T=tonnellata, a=anno, p=pianta, g=giorno

Comune di
Ancona

Biometereologia IBIMET CNR Bologna – Dr. Floriano Bonifazi

Alberi con ridotto rischio allergenico e con buon assorbimento dell'inquinamento dell'aria :F.Bonifazi 2020

Tiglio (*Tilia cordata*)

Olmo (*Ulmus*)

Robinia pseudoacacia

Platano (*Platanus occidentalis*)

Pino (*Pinus*)

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA

Alberi e loro classificazione in base alla capacità di ridurre l'inquinamento dell'aria
F.Bonifazi 2020

Effetti mitiganti	Specie
Eccellenti	Olmo, Frassino Maggiore, Tiglio di Wilde, Betulla Verrucosa, Acero Riccio, Bacca di Bagolaro
Buoni	Hombeam bianco, Acero di Campagna, Ciliegio, Liriodendro (albero dei tulipani), Alloro, Biancospino, Photinia Pettirosso, Melo
Medi	Sambuco, Pianto di Gelso, Albero di Giuda

Seo
ul

PLATANACEAE

Il *Platanus acerifolia* (hybrida) è utilizzato nei giardini e nelle alberature stradali, per la sua adattabilità alle variazioni climatiche. In Italia raramente si registrano picchi superiori ai 100 granuli/m³, mentre maggior importanza lo assume nei paesi spagnoli.

Il polline è piccolo (circa 18-21 μ) e viene liberato in gran quantità, ma le concentrazioni sono molto elevate solo in prossimità della pianta.

Fate cantare anche l'Allergologo!!
La Croce l'ha portata anche troppo....

BARCELONA SUPER BLOCKS

- **19.2% car reduction**
- **11.5 ug/m³ (24.3%) NO₂ reduction**
- **2.9 dB noise reduction**
- **3 fold increase green space (6.5% to 19.6%)**
- **20% Surface temperature reduction**

Baseline situation

Superblocks model

Annual Premature Deaths that the "Superblocks" Model Could Avoid in Barcelona

Source: Mueller et al. Changing the urban design of cities for health: the Superblock model. *Environment International*. 2019

ISGlobal

Mueller et al 2019, Env
Int

**Stagioni di fioritura allungate
da uno a quattro giorni
per decennio
nel corso degli ultimi 40 anni
nell'emisfero settentrionale.**

Ricambio di CO₂ e O₂ in atmosfera

PERCHE' IL QUADRO CLASSICO DELLE POLLINOSI DA ALBERI E' CAMBIATO ?

- per un aumento degli inquinanti atmosferici;
- per l'incremento globale delle allergopatie;
- per le recenti variazioni climatiche;
- per la presenza "reale" di nuove forme di pollinosi correlate all'aumento di certe specie di alberi ed erbacee a livello urbanistico e domiciliare

ACTUAL CHANGES

- **Virtually certain**
 - **Ealier onset**
 - **Changes in plant distribution**

- **Likely**
 - **Increased pollen production**
 - **Increased length of pollen season**
- **To be confirmed**
 - **Increased allergen content/allergenicity of pollen**

Monade.
Isopolare.
Sublobare e sferoidale.
Tricolpoporato.
In visione equatoriale:
subtriangolare
Pori circolari al centro di
solchi
Longitudinali lunghi ad
angolo acuto.
Esina spessa: superficie
psilata con
Microechinaturee si
assottiglia
In corrispondenza delle
aperture.
Intina spessa.
D: 20 mmicron

PREVALENZA IN ITALIA:
10-25 %

Artemisia vulgaris

Species	Percent	Potere allergenico	Emissioni BVOC
Ligustrum spp	62.50		
Robinia pseudoacacia	31.25		
Pinus pinea	6.25		

Legenda potere allergenico	
basso	
da basso a moderato	
moderato	
alto	
da alto a elevato	
elevato	

Legenda livello BVOC	
<1	basso
<1 - 10>	moderato
>10	alto

BVOC espressi in $\mu\text{g VOC g Leaf Dry weight}^{-1} \text{h}^{-1}$

È presente una specie emettitrice di polline, con livello alto/elevato, e due specie che emettono elevate quantità di BVOC. Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Nella valutazione si suggerisce di prendere in considerazione anche la composizione delle aree censite circostanti, in particolare della Id 42_Zona 46-233 Cittadella e Id 30_Zona 34-221 rispetto ai parametri su indicati per l'analisi.

Sezione Censuaria 18_ARCHI-CITTADELLA-VALLEMIANO

Totale specie	Numero	%	Potere allergenico	Emissioni BVOC
Platanus occidentalis	85	3.69		
Pinus pinea	77	3.34		
Fraxinus excelsior	71	3.08		
Nerium oleander	40	1.74	(-)*	
Pinus nigra	34	1.48		
Cupressus sempervirens	517	22.43		
Pinus halepensis	616	26.72		
Prunus species	11	0.48		
Allanthus altissima	25	1.08		
Arbutus unedo	39	1.70		
Robinia pseudoacacia	263	11.41		
Acer negundo	38	1.65		
Picea abies	6	0.26		
Quercus ilex	117	5.08		
Acer macrophyllum	4	0.17		
Acer campestre	4	0.17		
Cercis siliquastrum	24	1.04		
Ulmus species	6	0.26		
Cedrus atlantica	10	0.43		
Populus species	10	0.43		
Pinus brutia	4	0.17		
Cedrus species	3	0.13		
Pittosporum species	1	0.04		
Aesculus hippocastanum	12	0.52		
Tilia species	1	0.04		
Sophora japonica	15	0.65		
Laurus nobilis	37	1.63		
Olea europaea	8	0.35		
Ligustrum spp	16	0.69		
Ficus carica	3	0.13		
Cedrus deodara	29	1.26		
Populus nigra	25	1.08		
Thuja occidentalis	21	0.91		
Chamaerops humilis	1	0.04		
Prunus avium	1	0.04		
Betula spp	14	0.61		
Quercus robur	39	1.69		
Prunus domestica	42	1.82		
Corylus colurna	31	1.34		
Tamarix chinensis	9	0.39		
Pinus nigra	5	0.22		
Totale	2305	100

Figura 35. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 18

BENEFIT ANNUALI

7056 alberi totali

O₃ 2628.23 kg

PM₁₀ 1542.67 kg

Projected changes in the biology of ragweed and the consequences for aeroallergen production, distribution, and exposure

Methodology	Variables examined	Outcome	Implications
Glasshouses, growth chambers, single plants	Projected future CO ₂ concentrations, earlier springs	Bigger plants, more flowering, pollen production increases, more allergenic pollen	Pollen production and allergenicity might increase with climate change scenarios
Prairie grassland, plant mixture	1°C-2°C increase, clipping to simulate herbivory	Significant increases in pollen production and diameter with warming	Warming and herbivory might stimulate pollen size and production
Disturbed soil in urban-rural transect, plant succession	Urban microclimate of warmer temperatures, more CO ₂ , longer growing season	Larger plants, earlier flowering, reduced allergenicity	Microclimate changes similar to near-term IPCC projections might already be stimulating pollen production and increased exposure in urban areas
National Allergy Bureau and Aerobiology Canada, pollen counts	Start and end of pollen season since 1990s from Texas to Canada	Duration of pollen season increasing as a function of latitude in North America	Warming might have already altered pollen exposure in North America

- **PRIVE DI FRUTTI POTENZIALMENTE VELENOSI**
- **SCARSA ALLERGENICITA'**

Criteri generali di sicurezza per l'immissione di specie vegetali nelle aree pubbliche. Non solo decorativi ma anche preventivi di rischi per la salute dei cittadini

Gigaro o Arum italicum (Aracaceae)

Melbourne: November 21, 2016

THE LANCET
Planetary Health

ARTICLES | [VOLUME 2, ISSUE 6, PE255-E263, JUNE 01, 2018](#)

PD

The Melbourne epidemic thunderstorm asthma event 2016: an investigation of environmental triggers, effect on health services, and patient risk factors

Prof Francis Thien, MD • Paul J Beggs, PhD • Danny Csutoros, MPH • Jai Darvall, MBBS • Mark Hew, PhD

Janet M Davies, PhD • et al. [Show all authors](#)

[Open Access](#) • Published: June, 2018 • DOI: [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(18\)30120-7](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(18)30120-7) Check for updates

Health Impacts of Airborne Allergen Information Network (HALINE) 2009 -2011

The allergen Bet v 1 in fractions of ambient air deviates from birch pollen counts

Allergenic load?

Submicronic and/or
paucimicronic particles

Free molecules?

Birch pollen allergen Bet v 1 binds to and is transported through conjunctival epithelium in allergic patients

Table 1. Hypothesis regarding the factors explaining the increase in the prevalence of atopic disease

Genetic predisposition

Allergen exposure

Increased allergological diagnoses

Hygiene hypothesis

Environmental pollution

Exterior (air pollution)

Interior (e.g., smoking)

Others

Socioeconomic level

Older age of women at first child birth

Allergeni: il polline di cipresso è più allergenico nelle aree urbane

Air pollution can increase the expression of allergenic proteins, as response of plants to environmental threats.

Cupressus arizonica pollen grains from polluted cities showed a higher Cup a three concentration (a thaumatin-like protein (TLP) of the pathogenesis-related (PR) proteins family) than that found in pollen of less polluted areas.

This mechanism could determine an increase in the allergenicity of cypress pollen in urban areas

Parietaria

Composizione % delle biodiversità prevalenti ad Ancona
Anno 2020

OLEACEA

CORYLACEAE

FAGACEA

COMPOSITAE

Composizione % delle spore presenti ad Ancona

Calendario pollinico - Ancona, 2019-2021

POLLINI	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Aceraceae												
Amaranthaceae												
Betulaceae												
Alnus												
Betula												
Compositae												
Ambrosia												
Artemisia												
Altri												
Corylaceae												
Carpinus												
Corylus avellana												
Ostrya carpinifolia												
Cupressaceae/Taxaceae												
Fagaceae												
Castanea sativa												
Fagus sylvatica												
Quercus												
Gramineae												
Oleaceae												
Fraxinus												
Fraxinus excelsior												
Fraxinus ornus												
Olea												
Pinaceae												
Plantaginaceae												
Platanaceae												
Polygonaceae												
Salicaceae												
Populus												
Salix												
Ulmaceae												
Ulmus												
Urticaceae												

Legend: concentrazione assente molto bassa bassa media alta

Calendario spore funginee - Ancona, 2019-2021

CTP 1_(101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 210, 218, 219, 220, 227, 235, 250)

Figura 37. Conteggio delle specie presenti nella CTP1

CTP 1_(101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 210, 218, 219, 220, 227, 235, 250)

Figura 37. Conteggio delle specie presenti nella CTP1

PINACEAE

Cedrus spp.

Pinus spp.

Allergenicità: minima
Fioritura: aprile-maggio

Today's allergens are particularly aggressive

There is hypothesis that air pollutants promote airway sensitization by inducing changes in the allergenic content of airborne particles carrying antigens such as pollens.

Guillevain L et al. NEJM 2001 *Bebrendt H et al. Int Arch Allergy Immunol 1992*
D'Amato *al Eur Resp J 2002*

Compositae: *Ambrosia artemisiifolia*

Pinus pollen aerobiology and clinical sensitization in northwest Spain.

Marcos C.

Viene ribadita la rarità della sensibilizzazione e della clinica. Gli autori hanno poi identificato 10 pz monosensibili dal 1995 al 1999 con una sintomatologia tipo oculorinite persistente. Pz che vivevano in zone limitrofe a pinete (pollinosi da vicinato)

Palmae

FAM. ARECÁCEAS

Phoenix sp.

Allergenicità: minima

Fioritura: maggio-ottobre

panicoidea

CYNODON DACTYLON
Bermuda grass (g2)

Graminacee

PHLEUM PRATENSE
Timothy grass (g6)

Projections of the effects of climate change on allergic asthma: the contribution of aerobiology

L. Cecchi^{1,*}, G. D'Amato^{2,*}, J. G. Ayres^{3,*}, C. Galan⁴, F. Forastiere^{5,*}, B. Forsberg^{6,*}, J. Gerritsen⁷, C. Nunes^{8,*}, H. Behrendt^{9,*}, C. Akdis^{10,*}, R. Dahl¹¹ & I. Annesi-Maesano^{12,*}

Endorsed by EAACI and ERS

Anno 2015
Il Presidente
Onorario AAITO e'
stato messo in
quiescenza anche
dall'ospedale di
Ancona
Numerosi
incoraggiamenti
erano giunti
peraltro, da piu'
parti, da anni a
trovare finalmente
pace e riposo!!!

BETULA VERRUCOSA
Common Silver Birch (t.3)

Betulacee

Corylacee

Alberi con ridotto rischio allergenico e con buon assorbimento dell'inquinamento dell'aria :F.Bonifazi 2020

Tiglio (*Tilia cordata*)

Olmo (*Ulmus*)

Robinia pseudoacacia

Platano (*Platanus occidentalis*)

Pino (*Pinus*)

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA

Tiglio
nostrano
Famiglia:
Tiliacee

Piante di
10 anni al
momento
dell'
impianto

Assorbimento di
CO₂

Alta (2,8t/20a) capacità di accumulare CO₂ atmosferica nella biomassa (**103Kg/a** per i primi 5 anni, **155Kg/a** per i successivi 15 anni)

Formazione
potenziale di O₃

Bassa emissione di VOC e un **basso** potenziale di formazione di Ozono (< 1g O₃/p/g)

Assorbimento potenziale
di inquinanti gassosi

Alta capacità potenziale di assorbire gli inquinanti gassosi

Potenziale di cattura
delle polveri

Alto potenziale di cattura delle polveri sottili

Ottima
capacità di
mitigazione
ambientale

Nulla
potenzialità
allergizzante

T=tonnellata, a=anno, p=pianta, g=giorno

Allergenic proteins of *Phleum pratense*

Asthma in the desert spectrum of the sensitizing aeroallergens in Kuwait

The three most prevalent sensitizing pollens are horticultural plants imported for the purpose of "greeming" the desert
greeming the desert can affect public health

Ezeamuzie C.I. et al. Allergy 2000;55:157

Incidence of japanese cedar pollinosis in different environments. (Ishizaki, 1987).

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA

C TEMATICA DEL RUOLO DEL VERDE URBANO COME INQUINANTE DI NATURA BIOLOGICA O COME FATTORE DI MITIGAZIONE DEI DANNI DA INQUINAMENTO

si attua attraverso le seguenti attività:

- C.1 Raccolta dati aerobiologici sulla qualità e quantità settimanale di pollini e spore fungine presenti in atmosfera in Ancona**
- C.2 Censimento del verde cittadino delle caratteristiche delle piante per il loro ruolo allergizzante,assorbente o fonte emissiva di terpeni con successiva ipotesi di impiego di piante potenzialmente meno allergizzanti nelle zone pubbliche e che possano mitigare l'inquinamento**

Ragweed pollen collected along high-traffic roads shows a higher allergenicity than pollen sampled in vegetated areas

result

▶ Total pollen counts (weight) per tree

CO ₂ Concentration (ppm)	400ppm (ambient)	550ppm (ambient ×1.4)	700ppm (ambient ×1.8)
Total pollen weight per tree(mcg)	1.5	7.6 (4.5 times)	19.5 (14.0 times)

▶ Concentration of Que a1

CO ₂ Concentration (ppm)	400ppm (ambient)	550ppm (ambient ×1.4)	700ppm (ambient ×1.8)
Concentration of Que a 1 (µg/mL)	229.1	287.9 (1.26 times)	353.8(1.54 times)

Area 1

- Tilia tomentosa
- Tilia species

- Tilia species
- Nerium oleander
- Laurus nobilis

- Nerium oleander
- Cercis siliquastrum
- Platanus occidentalis
- Chamaerops humilis
- Pittosporum species
- Laurus nobilis
- Cedrus deodara
- Phoenix canariensis
- Catalpa bignonioides
- Juniperus spp

- Tilia species
- Prunus species
- Ligustrum species

- Pittosporum species
- Phoenix canariensis
- Pinus pinea
- Nerium oleander
- Pinus halepensis
- Cycas revoluta
- Quercus ilex
- Ligustrum species
- Lagerstroemia indica
- Chamaerops humilis

- Cupressus sempervirens
- Laurus nobilis
- Quercus robur
- Ligustrum species
- Nerium oleander
- Quercus ilex
- Ginkgo biloba 'Autumn Gold'
- Catalpa bignonioides
- Acer negundo
- Phoenix canariensis

- Tilia species
- Pinus pinea
- Celtis australis
- Aesculus hippocastanum
- Acer negundo
- Pinus sylvestris
- Chamaerops humilis
- Phoenix canariensis
- Ulmus species
- Sophora japonica

- Cercis siliquastrum
- Koelreuteria paniculata
- Cedrus deodara
- Laurus nobilis

- Sophora japonica
- Fraxinus excelsior
- Robinia pseudoacacia
- Ulmus species

GREEN AND LIVEABLE

- Greening cities has many health benefits including longer life expectancy, fewer mental health problems, better cognitive function, better mood and healthier babies
- It mitigates air pollution, heat and noise levels.
- CO2 sequestration
- Replacing roads and parking with green environments can be one way forward to change an environment from detrimental to beneficial.

Valore BVOC Itree 0.43 kg/anno

Species	Percent	Potere allergenico	Emissioni BVOC
Tilia species	65,52	low	
Prunus species	17,24		
Ligustrum spp	13,79	high	
Pinus pinea	3,45	low	

Legenda potere allergenico

basso	low
da basso a moderato	low to moderate
moderato	moderate
alto	high
da alto a elevato	high to elevated
elevato	elevated

Legenda livello BVOC

<1	basso
<1 - 10>	moderato
>10	alto

- Tilia species
- Prunus species
- Ligustrum spp

- Objects**
- Buildings
- Flow v**
- 1.00 m/s
 - 2.00 m/s
 - 3.00 m/s
 - 4.00 m/s
 - 5.00 m/s

BVOC espressi in $\mu\text{g VOC g Leaf Dry weight}^{-1} \text{h}^{-1}$

O₃ 9.90 kg

PM₁₀ 5.94 kg

Valore BVOC Itree 9.74 kg/anno

Air Temperature

Min: 34.51 °C
Max: 39.08 °C

Species	Percent	Potere allergenico	Emissioni BVOC
Pittosporum species	22,22		
Phoenix canariensis	17,78		
Pinus pinea	13,33		
Nerium oleander	13,33		
Pinus halepensis	11,11		
Cycas revoluta	4,44		
Quercus ilex	4,44		
Ligustrum spp	4,44		
Lagerstroemia indica	2,22		
Chamaerops humilis	2,22		
Other Species	4,44		

Legenda potere allergenico

basso	
da basso a moderato	
moderato	
alto	
da alto a elevato	
elevato	

Legenda livello BVOC

<1	basso
<1 - 10>	moderato
>10	alto

- Objects**
- Buildings
- Flow v**
- 1.00 m/s
 - 2.00 m/s
 - 3.00 m/s
 - 4.00 m/s
 - 5.00 m/s

BVOC espressi in $\mu\text{g VOC g Leaf Dry weight}^{-1} \text{ h}^{-1}$

O₃ 11.48 kg

PM₁₀ 8.16 kg

Valore BVOC Itree 1.57 kg/anno

Air Temperature

Min: 34.51 °C
Max: 39.08 °C

Species	Percent	Potere allergenico	Emissioni BVOC
Cupressus sempervirens	46,30		
Laurus nobilis	18,52		
Quercus robur	9,26		
Ligustrum spp	5,56		
Nerium oleander	5,56		
Quercus ilex	5,56		
Ginkgo biloba 'Autumn Gold'	3,70		
Betula species	1,85		
Acer negundo	1,85		
Phoenix canariensis	1,85		
Other Species	0,00		

Legenda potere allergenico	
basso	
da basso a moderato	
moderato	
alto	
da alto a elevato	
elevato	

Legenda livello BVOC	
<1	basso
<1 - 10>	moderato
>10	alto

- Cupressus sempervirens
- Laurus nobilis
- Quercus robur
- Ligustrum spp
- Nerium oleander
- Quercus ilex
- Ginkgo biloba 'Autumn Gold'
- Birch
- Acer negundo
- Phoenix canariensis

Objects

■ Buildings

Flow v

- ← 1.00 m/s
- ← 2.00 m/s
- ← 3.00 m/s
- ← 4.00 m/s
- ← 5.00 m/s

BVOC espressi in $\mu\text{g VOC g Leaf Dry weight}^{-1} \text{ h}^{-1}$

O₃ 4.69 kg

PM₁₀ 3.14 kg

Valore BVOC Itree 13.33 kg/anno

Area

a Diaz

Air Temperature

Min: 34.51 °C
Max: 39.08 °C

Objects

Buildings

Flow v

- + 1.00 m/s
- + 2.00 m/s
- + 3.00 m/s
- + 4.00 m/s
- + 5.00 m/s

Species	Percent	Potere allergenico	Emissioni BVOC
Cercis siliquastrum	53,73		
Koelreuteria paniculata	35,82		
Cedrus deodara	5,97		
Laurus nobilis	2,99		
Hibiscus syriacus	1,49		

Legenda potere allergenico	
basso	
da basso a moderato	
moderato	
alto	
da alto a elevato	
elevato	

Legenda livello BVOC	
<1	basso
<1 - 10>	moderato
>10	alto

- Cercis siliquastrum
- Koelreuteria paniculata
- Cedrus deodara
- Laurus nobilis

BVOC espressi in $\mu\text{g VOC g Leaf Dry weight}^{-1} \text{ h}^{-1}$

O₃ 8.93 kg

PM₁₀ 4.91 kg

Valore BVOC Itree 13.34 kg/anno

- Nerium oleander
- Cercis siliquastrum
- Platanus occidentalis
- Chamaerops humilis
- Pittosporum species
- Laurus nobilis
- Cedrus deodara
- Phoenix canariensis
- Betula Species
- Juniperus spp

Species	Percent	Potere allergenico	Emissioni BVOC
Nerium oleander	20,83		
Cercis siliquastrum	12,50		
Platanus occidentalis	12,50		
Chamaerops humilis	8,33		
Pittosporum species	8,33		
Laurus nobilis	6,25		
Cedrus deodara	6,25		
Phoenix canariensis	6,25		
Betula Species	6,25		
Juniperus spp	4,17		
Other Species	8,33		

Legenda potere allergenico

basso	
da basso a moderato	
moderato	
alto	
da alto a elevato	
elevato	

Legenda livello BVOC

<1	basso
<1 - 10>	moderato
>10	alto

- Objects**
- Buildings
- Flow v**
- + 1.00 m/s
 - + 2.00 m/s
 - + 3.00 m/s
 - + 4.00 m/s
 - + 5.00 m/s

O₃ 11.85 kg

PM₁₀ 3.19 kg

ANNUAL PREVENTABLE PREMATURE DEATHS AND AVERTED COSTS IN PHILADELPHIA

**646 premature deaths (4.7% of total)
prevented annually**

Averted cost \$6,2 billion annually

Effetti positivi del verde sulla salute

- 1) Riduzione degli effetti delle isole di calore
- 2) Ridotta mortalità cardiovascolare
- 3) Ridotta prevalenza del diabete di tipo 2
- 4) Migliorato funzionamento del sistema immunitario
- 5) Aumentato peso alla nascita

Effetti Negativi

- 1) Aumentato rischio di sviluppare allergie ed asma o sua severità
- 2) Eccesso di precursori dell'ozono nell'aria
- 3) Possibile aumentata esposizione a pesticidi o erbicidi
- 4) Aumentata esposizione a vari tipi di insetti
- 5) Eccessiva esposizione a raggi UV

Effetti Dubbi sui rapporti tra verde ed aumento atti criminosi

Cosa si aspettano gli allergologi (ed i pazienti) dall'aerobiologia molecolare?

- ✓ Di mettere fine alla storia infinita delle soglie cliniche delle concentrazioni polliniche
-
- ✓ Una nuova era delle previsioni aerobiologiche
 - ✓ Una più raffinata selezione dei pazienti da sottoporre ad immunoterapia (migliore efficacia)
 - ✓ Di completare la visione molecolare dell'allergologia

Allergenic pollen records (15 years) and sensitization in patients with respiratory allergy in Thessaloniki, Greece

Gioulekas D

→ In questo studio effettuato dal 1987 al 2001 per valutare l'incidenza delle pollinosi in 1311 asmatici quella da **ulmacee** non raggiungeva 1%. L'olmo libera pochissimo polline allergenico e fiorisce prima di emettere le foglie. Da qualche anno è colpito dalla "grafiosi" una malattia fungina che ha portato alla distruzione degli olmi vecchi in tutta Europa.

GREEN AND LIVEABLE

- Greening cities has many health benefits including longer life expectancy, fewer mental health problems, better cognitive function, better mood and healthier babies
- It mitigates air pollution, heat and noise levels.
- CO2 sequestration
- Replacing roads and parking with green environments can be one way forward to change an environment from detrimental to beneficial.

Effetti positivi del verde sulla salute

- 1) Riduzione degli effetti delle isole di calore
- 2) Ridotta mortalità cardiovascolare
- 3) Ridotta prevalenza del diabete di tipo 2
- 4) Migliorato funzionamento del sistema immunitario(?)
- 5) Aumentato peso alla nascita

Effetti Negativi

- 1) Aumentato rischio di sviluppare allergie ed asma o sua severità
- 2) Eccesso di precursori dell'ozono nell'aria
- 3) Possibile aumentata esposizione a pesticidi o erbicidi
- 4) Aumentata esposizione a vari tipi di insetti
- 5) Eccessiva esposizione a raggi UV

Effetti Dubbi sui rapporti tra verde ed aumento atti criminosi

- Acqua
- Terreno Nudo
- Asfalto
- Vegetazione
- Edifici
- Asfalto rosso
- Basalto
-

Projet Européen sur l'allergie au pollen de Cyprès.

Un projet de recherche (CRAFT 1999-71661) financé par la Communauté Européenne a été établi en 2003 pour la sélection de clones de plantes de Cyprès, *Cupressus sempervirens*, aptes à produire un pollen porteur de caractères « hypo allergisants », c'est-à-dire à allergisation réduite.

Nous avons identifié un clone, le numéro 49, qui produit un nombre mineur de pollens qui résultent aussi moins allergéniques par rapport aux autres pris en considération. En ligne théorique la diffusion de ce clone devrait faire décroître, à l'avenir, le risque de sensibilisation.

Salicaceae

© Jardin Mundani ©
Populus alba

Allergenicità: minima Fioritura: marzo-aprile

Sono consigliate le forme maschili che liberano in inverno poco polline scarsamente allergenico. Da evitare le forme femminili che in maggio producono i fastidiosi semi lanuginosi non allergenici

Pinus

ALBERI CON BASSA ALLERGENICITA'

**Olmo
(Ulmus)**